

## ASSOCIATION OF FELINE CLUBS

WWW.AFCLUBS.RU

AFC

WWW.AFCLUBS.RU

### Абиссинская кошка: история породы

Существует несколько версий происхождения абиссинской породы. Все они в определённой степени правдоподобны, но при этом содержат и весьма спорные моменты. Так что выбирайте, кому какая из версий нравится больше. Название абиссинской породы происходит от древнего названия страны в восточной части Африки – Абиссинии (ныне Эфиопия).

#### Поэтому **Версия 1. Абиссинская**

Прародительницей абиссинских кошек была кошка Зула, привезенная в Англию из Эфиопии, в то время называвшейся Абиссинией. Кошку вывез капитан Баррет-Ленард в 1868 году, по окончании Англо-абиссинской войны. Однако, никаких сведений документально подтверждающих, что от этой кошки были получены котята, в дальнейшем используемые для разведения, нет. Так что, скорее всего, Зуле мы обязаны только названием породы. Цветная литография кошки Зулы была опубликована в книге Гордона Стейблса "Кошки: их особенности и классификация" 1874.



#### **Версия 2. Египетская**

Египетская версия исходит из того, что абиссинская кошка очень похожа на египетские изображения священных кошек и сохранившиеся в большом количестве мумии кошек. Поэтому появилось мнение, что родина этих кошек не Эфиопия, а другая африканская страна, Египет. Как известно, у кошки в Древнем Египте был особый статус. Их почитали в качестве священных животных. Они содержались в храмах, будучи, таким образом, спутниками египетских богов. Кошки считались животными богини Баст, также известной как Бастет или Пашт, центром культа которой был Бубастис, город Нижнего Египта. Считалось, что Баст приходит на землю в обличье кошки. Баст часто изображали как женщину с кошачьей головой и с корзинкой котят в левой руке.





Египетская версия происхождения абиссинской породы стала особенно популярной в Англии ещё в конце 19 века, т.к. в то время английские археологи вели активные раскопки в Египте, и раскопки эти получили широкий общественный резонанс. Уязвимость египетской версии в том, что древнеегипетские изображения кошек стилизованы и весьма условны. Скорее всего, одомашненные египетские кошки произошли от диких видов кошек, населявших Африку. Наибольшее сходство с домашней кошкой имеет подвид *Felis silvestris libyca*.



### Версия 3. Дикая Африканская

#### I. *Felis silvestris libyca*

Некоторые исследователи утверждают, что кошка, привезённая в Англию и выставявшаяся под названием абиссинская, была не домашней, а прирученной дикой кошкой. Наиболее вероятно, что она принадлежала к подвиду *Felis silvestris libyca*, имеющего несомненное внешнее сходство с абиссинской кошкой. Другие названия этой кошки: североафриканская, желтая, буланая, степная, ливийская. Степная кошка обитает в степных районах Африки и Ближнего Востока. Основной окрас этого вида – бурый с тёмными полосами и пятнами. Известно несколько цветовых вариаций без полос и пятен или со слабо выраженными пятнами. Эти дикие кошки легко приручаются.



## II. Felis chaus



В Северной Африке есть и другие виды диких кошек, схожих с абиссинской породой, например, камышовый кот или болотная рысь *Felis chaus* (хаус). Камышовый кот крупнее домашних кошек: в длину достигает 73-75 см, масса от 4 до 16 кг. Тело у хауса сравнительно короткое, ноги высокие, хвост недлинный, на ушах небольшие кисточки. Котята хаусов пятнистые, нередко этот "теневой" рисунок можно заметить и у взрослых животных. Хаусы довольно легко приручаются, по сравнению с другими видами диких кошек. Мумии этих кошек были найдены в гробницах египетских фараонов. Этот вид занесён в Красную Книгу России. Подвиды *Felis chaus* обитают на Ближнем Востоке, в Юго-восточной Азии и в Индии.

### Версия 4. Восточно-Азиатская

Уязвимость предыдущих версий состоит в том, что в Северной Африке в популяциях домашних кошек окрас абиссинский табби не встречается. Напротив, этот окрас распространён в популяциях Сингапура и Юго-восточной Азии. Поэтому высказывалась гипотеза, что родоначальник породы был вывезен не из Африки, а из Юго-Восточной Азии или Афганистана. Во второй половине 19 века Англия вела немало колониальных войн, отставные военные возвращались со всех концов света. В этом случае получается, что своё название порода получила просто по ошибке. Эту версию подкрепляет следующий факт: в 1834-1836 гг. для выставки в Лейденском зоологическом музее в Голландии было приобретено чучело кошки дикого окраса. Надпись под чучелом кошки гласила: "Патри, домашняя кошка из Индии".



### Версия 5. Английская

И, наконец, многие исследователи высказывали точку зрения, что порода была выведена английскими заводчиками на основе аборигенных кошек.



Окрас абиссинский табби среди аборигенных кошек Англии не встречается, но возможны спонтанные мутации: иногда (очень редко) у обычных кошек окраса табби рождаются котята практически без полос на теле. Возможно, заводчики скрещивали местных кошек с какими-то привозными кошками, в частности, с кошками, импортированными с Востока. Проводились ли подобные скрещивания в 1880-1900-х годах доподлинно не известно.


### Факты

Помимо этих версий существуют строго задокументированные факты.


Первую кошку, названную абиссинской, привезли в Англию в 1868 году, а в 1871 году она выставлялась под кличкой Зула в лондонском Кристалл-Паласе. Первое упоминание в СМИ о кошке абиссинской породы относится к январю 1872 года: статья в газете "Харперс уикли" рассказывала о декабрьской выставке в Кристалл-Паласе и упоминала абиссинскую кошку, занявшую третье место. В 1874 году Гордон Стейблс подробно описал новую породу в своей книге "Кошки: их особенности и классификация".

В 1882 году порода была официально признана в Англии. В последующие годы её качества закрепили и улучшили путём скрещивания с британской короткошерстной кошкой. В 1889 году Харрисон Вейр опубликовал первый стандарт породы в своей книге "Всё о кошках". Он описал абиссинский окрас следующим образом: насыщенный коричневый с чёрным тикингом, напоминающий окрас диких кроликов, только менее сероватый. В то время абиссинский окрас так и назывался – кроличий.

В 1896 году абиссинские кошки были впервые зарегистрированы в племенной книге Национального кошачьего клуба (National Cat Club) Великобритании – кот Sedgemere Bottle, рождённый в 1892 году, и кошка Sedgemere Peaty рождённая в 1894 году. В 1900-1905 гг. в племенной книге были зарегистрированы ещё 12 абиссинцев, у половины из которых родители значились как неизвестные.



В то время абиссинские кошки имели весьма разнообразные окрасы. Существует мнение, что первые абиссинские кошки были серебристого окраса с остатками рисунка в виде полосок. Одни из первых зарегистрированных абиссинок носили имена (Алюминий), Quicksilver (Ртуть), Silver Memelik (Серебряный Мемелик), Silver Fairy (Серебряная Фея) и Salt (Соль) – едва ли красновато-коричневого "дикого" абиссинца назвали бы таким именем. В книге супругов Сидни и Хелен Денхэм "Дитя Богов" (1951) указывалось, что кошка серебристого окраса Fancy Free победила на чемпионате абиссинской породы, проходившем в Вестминстере в 1909 году.



В 1907 году две первые абиссинские кошки были вывезены в Америку – это был кот серебристого окраса Aluminum II и кошка Salt. К 1920-м годам серебристые окрасы в Англии практически исчезли. В Америке серебристый окрас не получил распространения и не был признан фелинологическими организациями. Разведение серебристых абиссинов в Англии возобновилось лишь в 1960-е. В США развитием породы занялись вплотную в конце первого десятилетия XX века, и в 1917 году она была признана CFA. Во Францию абиссинки попали в 1927 году. В 30-х годах порода получила распространение в континентальной Европе. Во время Второй мировой войны порода в Европе почти полностью исчезла – сохранилась лишь пара десятков кошек. После войны породу удалось воссоздать благодаря импорту кошек из Америки.

В 1970-е многие абиссинские линии в Англии вымерли из-за эпидемии вирусной лейкемии кошек. К 1978 году в Англии сохранилось лишь около десятка производителей.

За прошедшие сто лет порода несколько изменила свой облик: кошки стали немного мельче и изящней, костяк сделался легче, уши больше. Прибавились новые цветовые вариации, а дикий окрас стал заметно "теплее". В 1963 году получил признание новый окрас – первоначально он именовался рыжим (red), но в 1979 году его переименовали в соррель: стало ясно, что ген, отвечающий за этот окрас, – это ген окраса циннамон, который встречается и в других породах. Он не имеет ничего общего со связанным с полом геном рыжего окраса. Голубой окрас был признан в 1984 году, окрас фавн – в 1995 году как экспериментальный и в 2000 году как полноценный.

В России абиссинские кошки появились в 1990-е годы, Первые российские питомники – "Золотой лев", "Табити". Большое значение для развития породы имел кот дикого окраса Tabiti's Lancelot, представляющий первое поколение американских абиссинов в России.