

ASSOCIATION OF FELINE CLUBS

AFC

WWW.AFCLUBS.RU

WWW.AFCCLUBS.RU

ИСТОРИЯ ПОРОДЫ - КАНАДСКИЙ СФИНКС

Отдельные случаи появления бесшерстных котят в пометах обычных кошек наблюдались по всему миру. Однако ни в одном случае не было предпринято попытки создать новую породу.



Prune, a Hairless Cat

Возникновение породы бесшерстных кошек связывают с 1966 годом, когда в Онтарио, в Канаде, среди котят нормальной домашней кошки Элизабет был обнаружен бесшерстный котенок, которого назвали Прун (Prune).

Эти две кошки, Элизабет и Прун, были приобретены Ридьядом и Янией Бава (Bawa), которые и захотели вывести эту замечательную породу. Киз и Рита Тенхоув (Tenhove) вскоре присоединились к чете Бава (Bawa) в их нелегком труде по выведению голых кошек. Кстати, первоначально канадских сфинксов называли не иначе, как «кошками лунного камня», а позже «лысыми канадцами». Название, используемое сегодня, возникло не так давно.

Спустя положенное время Прун был скрещен со своей матерью и в помете появились нормальные и бесшерстные котята. До тех пор, пока это было возможным, Пруна сводили с его дочерьми, внучками, чтобы сохранить возможно больше первоначальных генов.

В результате получилось две разновидности сфинксов, несколько отличающиеся внешним видом. Итак, две пары канадских сфинксов Бава (Bawa) и Тенхоув (Tenhove) начали совместную племенную работу. Естественно, что вначале своего становления эта порода не имела право на регистрацию, и поэтому сохранилось очень мало документальных сведений о первых кошках и первых программах разведения. Однако вскоре в США и Канаде перестали разводить сфинксов.


В 1971 году CFA отозвало временный статус породы, данный ей до этого. В чем же было дело?

Разведение сфинксов терпело неудачи сразу по нескольким причинам:

1. Во-первых, бесшерстных животных было очень мало, поэтому не было надежды хоть немного стабилизировать данную породу. К тому же заводчики так и не могли разобраться в генетике сфинксов.
2. Во-вторых, бесшерстные котята в отличие от своих собратьев оказались очень требовательны к уходу, и именно по этой причине практически сразу же после своего рождения многие погибали.
3. Ну а в-третьих, в первых питомниках владельцы неправильно разработали стратегию разведения породы бесшерстных кошек.



Bambi 6.25.1978- 11/5.1994



О кошках линии Бава-Тенхоув известно не так много. Один кот по кличке Эпидермис был приобретен Дэвидом Мэйром из Сан-Франциско, и пара кошек попала к Сэнди Кэйсер в ее питомник «Mewsi-Kal» в 1973 году.


Эпидермис в значительной мере поспособствовал вовлечению своего хозяина Дэвида Мэйра (Mare) в процесс выведения породы Канадский сфинкс в Соединенных Штатах. Мэйр активно интересуется новыми причудливыми кошками и позднее покупает также голую кошку Алопеция (Alopescia Totalis) у доктора Хьюго Хернэндеза (Hugo Hernandez) из Голландии. Третьим канадским сфинксом Мэйра был голый кот из Северной Каролины, названный Е.Т., который неоднократно выставлялся на выставках кошек в Мэдисон Парке (Madison Square Garden) в 1980-х годах. К сожалению, от сфинксов Мэйра нет никакого известного потомства.

Потомство пары Нефертити Дучи и Пруна Наполеона, приобретенной Сэнди Кэйсер, было отправлено в Европу голландскому доктору Хьюго Хернэндезу в 1978 году. Это были кот Старски (Mewsi-Kal Starsky) и кошка Джонни (Mewsi-Kal Jhonny). Таким образом, началось выведение канадских сфинксов за пределами материка.

В том же 1978 году Шерли Смит (Smith) из канадского города Торонто спасла двух оставленных матерью котят, родившихся от домашней короткошерстной кошки: длинношерстную кошечку и черно-белого голого котика, позднее получившего имя Бэмби. Из-за многочисленных ран Шерли вынуждена была стерилизовать Бэмби. Однако, он прожил долгую счастливую жизнь в питомнике «Aztec».



Мать Бэмби в 1980 году родила еще двух голых котят женского пола. Смиты назвали котят Скуэки (Squeakie) и Пинки (Pinky). Впоследствии они были отправлены в Голландию и появились в программе разведения канадского сфинкса доктора Хернэндеза как Панки (Punkie) и Палома (Paloma).



Доктора Хернэндез внес значительный вклад в выведение породы Канадский сфинкс. Сначала он попытался скрестить брата и сестру Mewsi-Kal Starsky и Mewsi-Kal Jhonny. Однако, результаты не оправдали ожидания доктора: все котята единственного помета погибли, так как мать отказалась от них. После того, как Punkie и Paloma прибыли из Канады, доктор Хернэндез попытался повязать Mewsi-Kal Starsky с «новоприбывшими дамами». Но кот никоим образом не хотел принимать новых кошек, и доктору Хернэндезу пришлось кастрировать его в 1981 году. Paloma отдали другой голландской заводчице Нэнни Натан (Hannie Nathans), и тут обнаружилось, что кошка была беременна, от Mewsi-Kal Starsky, разумеется. К сожалению, Paloma не смогла выносить детенышей и потеряла помет. В распоряжении голландских заводчиков не осталось ни одного канадского сфинкса для использования в программе разведения. И тогда доктор Хернэндез решил впервые использовать кота девон-рекса. Paloma была повязана с девон-рексом по кличке Керэр ван Джетрофин (Curare van Jetrophin). В помете родились бесшерстные котята, и это была настоящая победа. Для пополнения генетического материала породы Канадский сфинкс регулярно начали использовать кошек породы Девон-рекс, благодаря которым сфинксы стали обладателями больших ушей.



Epidermis

В 1981, Ким Муеск (Muesk) из питомника «Stardust» в штате Орегон приобрела двух голых кошек. Их звали Эпидерма (Epidermis), кошка окраса черного классический табби, родившаяся в июле 1975, и Дерма (Dermis), голубого макрелевого окраса, родившаяся в апреле 1976.



Dermis

Их родители были обычными полосатыми короткошерстными котом и кошкой. После неудачных попыток получить лысых котят при вязке Эпидермы и Дермы с американскими короткошерстными котами Ким Муеск по совету доктора Сольвейга Пфлуэджера приобрела девон-рексов для своей программы.

Таким образом, практически в одно и то же время канадские сфинксы выводились в США и Голландии, используя при этом кошек породы Девон-рекс.

В начале 1980-х годов разведением этой породы также начинают заниматься во Франции (заводчики Патрик Шалэн и пара Филипп и Элин Ноэль).



Britanya's Lady Godiva

Britanya's Baroness Quizit

В 1985 году Кэрол и Уолт Ричард из питомника "Britanya" в Техасе начали свою собственную программу разведения этой породы через работу с доктором Сольвейгом Пфлуеджером (Solveig Pflueger), председателем отдела генетики в TICA.

Кошка из этого питомника **Леди Британья Годива** (Britanya's Lady Godiva) стала первым сфинксом, достигшим в 1986 году статуса Supreme Grand Champion в TICA, а также, получившая титул TICA — Сфинкс года.



Генетика, вызывающая бесшерстность у канадских сфинксов, рецессивная. В дальнейшем, чтобы поддержать генетически породу Канадских сфинксов, и в Европе, и в Америке полученных котят скрещивали как со сфинксами, так и с девон-рексами. Однако за все надо платить. Такой массивный прилив крови другой, хотя и генетически близкой породы, не прошел даром для канадских сфинксов. К сожалению, канадские сфинксы некоторых линий, очень похожи на раздетых девон-рексов: тонкая кожа, короткая голова с круглыми глазами, уши достаточно низкого постава.

Характерный для Канадских сфинксов признак - излишне складчатая кожа, делающая их похожими на маленьких старичков. Признак, присущий именно канадским сфинксам, - толстая кожа, образующая складки. Котята до одного месяца целиком в "складочку", включая даже хвост и лапы. С возрастом морщины разглаживаются, и у взрослых они остаются на голове, шее, немного на животе и туловище, что придает им характерный вид "старичков". Чем больше сохраняется складок у взрослого сфинкса - тем лучше, а их нехватка считается серьезным недостатком.

Признание канадских сфинксов как породы было непростым, и только «вторая волна» в разведении, начавшаяся от повторно найденных животных, позволила создать эту уникальную породу. На данный момент порода Канадский сфинкс признана практически во всех фелинологических организациях.

